

Angine à streptocoque
du groupe A ?



Test de Diagnostic Rapide

angine

Le complément indispensable
à votre examen clinique



SI ON LES UTILISE A TORT,
ILS DEVIENDRONT MOINS FORTS.

 l'Assurance
Maladie

> Pourquoi faire un TDR angine ?

> **Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifiques des angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA).**


Complément indispensable de l'examen clinique, le **TDR** angine confirme l'étiologie à SGA. Il réduit le risque de passer à côté de cette angine bactérienne.*

Fiabilité du **TDR** angine : **sensibilité > 90 %**, **spécificité > 95 %**.

> **Utiliser les antibiotiques de manière ciblée, c'est préserver leur efficacité.** Le **TDR** angine permet de réserver les antibiotiques aux angines à SGA et évite ainsi de prescrire ces médicaments inutilement.

> Pour quel patient ?**

Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée



Pas de nécessité de pratiquer un **TDR** angine, ni de traiter par antibiotiques chez :

- > Enfant < 3 ans (angine à SGA rare, Rhumatisme Articulaire Aigu exceptionnel)
- > Adulte + score de Mac Isaac < 2

* Humair, Antonini Revaz, Bovier *et al.* Management of Acute Pharyngitis in Adults. Arch Intern Med 2006;166:640-644.

** AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Recommandations. Octobre 2005.

*** Sans facteur de risque de RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu), ce résultat ne justifie pas de contrôle supplémentaire systématique par culture, ni de traitement antibiotique.

> Le TDR angine, un outil intégré à la consultation

Au début de l'examen, devant des signes cliniques d'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée :



Prélèvement



1 minute
Mise en contact du prélèvement avec les réactifs



5 minutes
Immersion du test



Lecture du résultat en fin de consultation

Dans la plupart des cas, le **TDR** angine se révèle négatif car les angines sont d'origine virale dans :

- 75 à 90 % des cas chez l'adulte,
- 60 à 75 % chez l'enfant.

En quelques minutes, avec le **TDR** angine, vous contribuez à préserver l'efficacité des antibiotiques.



Angine à streptocoque du groupe A ?

L'Assurance Maladie se mobilise pour préserver l'efficacité des antibiotiques et lutter contre le développement des résistances bactériennes.

Elle met gratuitement des **TDR** angine à la disposition des médecins libéraux généralistes, pédiatres et ORL.

> Comment recevoir gratuitement vos **TDR** angine ?

> Commandez sur internet : <https://espacepro.ameli.fr/>

Accueil

Assurance Maladie Espace pro

MEDICINE GÉNÉRALE

Bienvenue

Accueil

Activités

PAIEMENTS

- Tiers Payant: Recherche par date de paiements
- Tiers Payant: Recherche par date d'actes
- Relevés manuels de paiements
- Rémunération spécifique médecin traitant ALD
- Aides à la télétransmission
- Gardes et astreintes
- Indus
- Relevés d'honoraires

PRATIQUE

- Le CAP1
- Patiente médecin traitant
- Relevé individuel d'antibiotiques et de prescriptions

Services patient

Services accessibles uniquement par carte CPS

Grâce à la carte CPS, vous pouvez disposer des services suivants :

- avis d'arrêt de travail,
- ALD / Protocoles de soins du patient,
- Protocoles de soins,
- Historique des remboursements,
- Déclaration de choix de médecin traitant.

Si vous souhaitez adhérer cliquez ici

Identification Patient

Pour accéder au dossier administratif du patient, saisissez son NIR :

Valider

Pour accéder aux données médicales du patient vous devez vous connecter à Espace pro avec votre carte CPS et disposer de la carte vitale du patient.

Recevez vos TDR angine Cliquez ici

Commandes

Commander des imprimés

Historique des commandes

Formulaires en ligne

Test de diagnostic rapide angine

Nouveau ! + simple + rapide

> Ou commandez sur papier :

- Demandez un **bon de commande pré-identifié** au correspondant **TDR** de votre Caisse ou à votre Délégué de l'Assurance Maladie.
- Ou faites votre demande sur **papier libre** ou sur **ordonnance** comportant votre nom, votre adresse professionnelle, votre identifiant et votre spécialité. Indiquez clairement le nombre de boîtes de **TDR** angine souhaitées (20 tests par boîte) ainsi que l'adresse de livraison, si elle diffère de votre adresse professionnelle. A envoyer au correspondant **TDR** de votre Caisse ou à remettre à votre DAM, datée et signée.



SI ON LES UTILISE A TORT,
ILS DEVIENDRONT MOINS FORTS.